

Präparat (Wirkstoff)	Aufwand- menge	Anwendungshinweise	Wirkung gegen		Warte- zeit (Tage)
			Echter Mehltau	Alternaria, Cercospora	
Bioblatt Mehltaumittel (Lecithin)	0,9 l/ha, max. 12 Anw.	Anwendung bei Befallsgefahr im Abstand von 7-10 Tagen	X		F
Discus (18b), (Kresoxim-methyl)	0,5 kg /ha, max. 1 Anw.	Anwendung bei Befallsgefahr	X	X	35
Flint (Trifloxystrobin)	0,4 kg /ha, max. 2 Anw.	Anwendung bei Befallsgefahr im Abstand von 7 - 10 Tagen	X	X	21
Folicur (Tebuconazol)	1,0 l/ha max. 3 Anw.	Anwendung bei Befallsbeginn im Abstand von 14-21 Tagen		X	21
Funguran (Kupferoxychlorid)	3,3 kg/ha Max. 2 Anw.	Anwendung bei Befallsbeginn im Abstand von 10-14 Tagen		X	14
Kumululus WG u.a. (Schwefel)	1,5 kg /ha, max. 6 Anw.	Anwendung bei Befallsgefahr im Abstand von 5 - 7 Tagen	X		7
Ortiva (Azoxystrobin)	1,0 l /ha, max. 2 Anw.	Anwendung bei Befallsgefahr im Abstand von 7 - 10 Tagen	X	X	14
Score (Difenoconazol)	0,4 l /ha, max. 3 Anw.	Anwendung bei Befallsbeginn im Abstand von 14-21 Tagen	X	X	21
Signum (Boscalid + Pyraclostrobin)	0,75 kg/ha max. 2 Anw.	Anwendung bei Befallsbeginn im Abstand von 7-12 Tagen	X	X	14

(X) = Nebenwirkung

18b = Einzelbetriebliche Genehmigung erforderlich, die vor Anwendung beim zuständigen Pflanzenschutzdienst beantragt werden muss.

F = Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich